AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-5-70 064762

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES
(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55, Rue Mazenod — 69 - LYON-3e
Tél. 60-95-87 et 60-94-91 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C. C. P. LYON 9431-17
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
55, Rue Mazenod — 69 - LYON-3e

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

1er supplément au bulletin N° 116 de Mai 1970 26 Mai 1970

VIGNE

AVERTISSEMENTS

MILDIOU - Les premiers foyers étant apparus les traitements devront être généralisés dès réception dans toutes les régions. Dans les zones contaminées par le black-rot, on utilisera un produit efficace contre les deux maladies simultanément.

VERS DE LA GRAPPE - Le premier traitement devra être étendu en toutes régions ou renouvelé:
- avant le 2 juin avec les produits à action préventive (ou plus tôt en cas de forte pluie survenue depuis le 23 mai, sur les secteurs déjà traités)
- autour du 6 juin avec les produits à action curative.

INFORMATIONS

OIDIUM - Les traitements appliqués dans les prochains jours sur cépages sensibles auront une importance primordiale.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER - Dans le bassin de la Loire et dans les situations très aérées et à sol perméable des autres régions, des contaminations primaires peuvent encore se produire et des taches apparaitre au-delà du 4 juin nécessitant le maintien de la protection après cette date. Dans les autres situations, on pourra relâcher la protection dans les plantations absolument indemnes à cette date, surveiller l'apparition éventuelle des premières taches et n'intervenir qu'à ce moment.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - pépinières et arbres en formation seulement - Un traitement contre la 1ère génération de chenilles devra être appliqué dès réception dans toute la zone de culture du pêcher.

INFORMATIONS

BACTERIOSE DU NOYER - Se reporter au bulletin précédent.

MALADIES DES PETITS FRUITS ROUGES - Poursuivre ou reprendre la protection contre didymella et anthracnose sur framboisier et contre l'oïdium du cassissier.

CULTURES DIVERSES

INFORMATIONS

VERS GRIS (noctuelle "scotia ypsilon")- Des attaques explosives de cette chenille ont déjà débuté dans le sud de la circonscription. Il s'agit d'une espèce migratrice mais qui existe également en permanence dans la région et y a trouvé cette année ses conditions favorables quelques jours plus tard que dans les régions méridionales plus chaudes. Elle s'attaque la nuit principalement aux jeunes cultures de tomates, pommes de terre, tabac, choux, navets, maïs,etc.. Elle reste enterrée le jour.

Sur les cultures encore peu attaquées ou à l'apparition des premiers dégâts (surveillance quotidienne absolument nécessaire) on répandra 70kg à l'hectare d'appâts contenant pour 100kg de son et 30 litres d'eau, en matière active un des produits suivants:
150gr aldrine ou dieldrine - 200gr d'endosulfan - 300gr d'heptachlore - 500gr de chlordane, de lindane ou de D.D.T. - 750gr de toxaphène.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
A.PITHIOUD

Le Contrôleur chargé des Avertissements agricoles
P.LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L.BOUYX

P86